

Benedetto Lanza

NOTA PRELIMINARE SULLA FAUNA DI ALCUNE GROTTE
DEI MONTI DELLA CALVANA (Firenze)

Non permettendomi l'attuale crisi tipografica la pubblicazione di una mia ampia relazione su questo argomento, già da vario tempo pronta, ho creduto opportuno dare alla stampa questa breve nota, che potrebbe essere di qualche interesse per gli speleologi.

Le grotte da me esplorate (anni 1941-46) sono le seguenti: Spelonca delle Pille (N. 1 T.), Spelonca presso Colle Fiesoli (N. 2 T.), Speloncaccia (N. 3 T.), Buca del Ciuco (N. 4 T.) e Grotta della Fonte Buia (N. 5 T.). Riferirono ampiamente su di esse BIANCHI F., CIARANFI E. e LEVI M. (Grotte di Toscana; Le Grotte d'Italia; anno III, N. 1, 1929) e, più tardi, CIARANFI E. (Grotte di Toscana; Le Grotte d'Italia; anno III, N. 4, 1929). Le suddette caverne sono rispettivamente situate a m. 760, m. 715, m. 725, m. 740 e a m. 395 sopra il livello del mare.

Pongo i miei più vivi ringraziamenti ai distinti Specialisti, che gentilmente vollero studiare il materiale da me raccolto.

VERMES

Oligochaeta (Det. I. Sciacchitano).

Eisenia rosea (Sav.) f. *typica*. - N. 3 T. - Specie nuova per la fauna toscana.

Eisenia spelaea (Rosa). - N. 1 T. - Specie nuova per la fauna toscana.

Bimastus constrictus (Rosa) (= *B. tenuis* (Eis.)). - N. 3 T.

Octolasmium mima (Rosa) f. *typica*. - N. 3 T. - Specie nuova per la Toscana e per la speleofauna.

Octolasmium complanatum (Ant. Dug.) (= *O. transpadanum* (Rosa) e *lissaense* (Mich.)). - N. 1 e N. 3 T.

Hirudinea (Det. I. Sciacchitano).

Herpobdella octoculata (L.) var. *atomaria* Carena. - N. 5 T.

GASTROPODA**Mesogastropoda** (Det. C. Alzona).*Valvata* sp.. - N. 5 T.*Bythinella opaca* Frauenfeld. - N. 5 T.**Stylommatophora** (Det. C. Alzona).*Clausilia* indet.. - N. 1 T.*Oxychilus draparnaldi* (Beck). - N. 1 T.**CRUSTACEA****Amphipoda** (Det. S. Ruffo)*Niphargus stygius* (Schiödte) (*sensu lato!*). - N. 1 e N. 3 T.*Gammarus (Echinogammarus) pungens* M. Edw.. - N. 5 T. - Esemplari con occhi ridotti.**Isopoda** (Det. A. Brian e A. Arcangeli).*Trichoniscus noricus noricus* Verh.. - N. 1 T. - det. Brian - Questa specie non era mai stata raccolta in grotta.*Cylisticus plumbeus* Verh.. - N. 1 T. - det. Arcangeli.*Philoscia (Philoscia) affinis* Verh.. - N. 1 e N. 3 T. - det. Arcangeli.**ARACHNIDA****Chernetes** (Det. L. Di Caporiacco).*Chthonius* indet.. - N. 1 T.**Araneae** (Det. L. Di Caporiacco).*Amaurobius scopolii* Thorell. - N. 1 T. Determinazione incerta.*Gonatium corallipes* (Cambr.). - N. 1 T.*Lepthyphantes florentinus* Di Caporiacco. - N. 1 T. - Specie nuova per la Scienza, non ancora descritta; ha occhi ben sviluppati. L'ho raccolta quasi sempre sotto pietre, in zona del tutto buia, ma anche in penombra, tra detriti vegetali.*Meta menardi* (Scop.). - N. 1 e N. 3 T.*Tegenaria pusilla* Simon. - N. 1 T. Nuova per la speleofauna.*Nesticus eremita italicus* Di Caporiacco. - N. 1 e N. 3 T.*Lessertia dentichelis* (Simon). - N. 1 T.**Acari** (Det. G. Lombardini).*Ixodes vespertilionis* Koch. - N. 3 e N. 4 T. - Su *Rhinolophus hipposideros minimus* Heugl. e *Rhinolophus ferrum-equinum ferrum-equinum* (Schreb.).

Ripicephalus sanguineus Latr.. - N. 4 T. - Su *Rhinolophus hip.*
minimus Heugl. Nuovo per la speleofauna.

Spinturnix vespertilionis var. *lanzai* Lombardini. - N. 4 T. -
Forma nuova per la Scienza (Redia, vol. XXX, 1943). Su
la membrana alare di *Rhinolophus hipposideros minimus*
Heugl..

Liponyssus arcuatus (Koch). - N. 3 T. Nuovo per la speleofauna.
Pergamasus theseus var. *alpinus* Berl.. - N. 1 T. Nuovo per la
speleofauna.

Periglischrus euryalis G. Canestrini. - N. 4 T. - Su *Rhin. hip.*
minimus Heugl.. Nuovo per la speleofauna.

MYRIAPODA

Nematophora (Det. P. Manfredi).

Gen. spec. (larve indet.). - N. 1 e N. 3 T.

Atractosoma cecconii var. *florentinum* Manfredi. - N. 3 T. -
Forma nuova per la Scienza; verrà descritta prossimamente.
L'ho raccolta in penombra e al buio completo.

HEXAPODA

Orthoptera (Det. F. Capra).

Dolichopoda palpata Sulz. (*sensu lato!*). - N. 1 T. e N. 3 T.

Rhacocleis germanica (H. S.). - N. 1 T. - Specie nuova per
la speleofauna.

Trichoptera (Det. G. Moretti).

Stenophylax sp. (femmine indeterminabili, forse del gruppo *vibex*
Curt.). - N. 3 T.

Stenophylax sp. (femmina indet., forse del gruppo *permistus*
Mc. L. o del *latipennis* Curt.). - N. 3 T.

Coleoptera (Det. A. Gagliardi,

S. Ruffo, A. Focarile, G. Marcuzzi e B. Lanza).

Cyclus italicus Bon.. - N. 3 T.

Carabus (Tomocarabus) convergens paganettii Born.. - N. 3 T.
Nuovo per la speleofauna.

Nebria brevicollis Fabr.. - N. 1 T.

Asaphidion stierlini Heyd.. - N. 1, N. 2 e N. 3 T. Credo sia
nuovo per la speleofauna.

Trechus quadristriatus Schrank. - N. 1, N. 2 e N. 3 T.

Duvalius bianchii Jean. - N. 1 e N. 3 T. - Di questa specie assai rara ho trovato anche il maschio e la larva.

Laemostenus latialis Leoni. - N. 1 T. - Questa specie è stata raccolta finora in Toscana solo nella Spelonca delle Pille (Cfr. A. Gagliardi; Mem. Soc. Ent. It., vol. XX, fasc. 1, 1941).

Pterostichus cristatus picipes Chaud.. - N. 2 e N. 3 T. Nuovo per la speleofauna.

Percus paykulli Dej.. - N. 3 T. Nuovo per la speleofauna.

Ophonus (Pseudophonus) pubescens Müll.. - N. 3 T. Nuovo per la speleofauna.

Lebia cyanocephala L.. - N. 3 T. Nuova per la speleofauna.

Quedius tristis Gravh.. - N. 1 T. Nuovo per la speleofauna.

Atheta sp.. - N. 3 T.

Bythinus sp.. - N. 3 T.

Choleva sturmi Bris.. - N. 5 T. - det. Marcuzzi.

Anemadus acicularis Kraatz. - N. 5 T. - det. Marcuzzi.

Leptinus testaceus Müll.. - N. 1 T.; nel N. 3 T. lo raccolse il Sig. M. Lombardi nel 1925.

Otiorhynchus sp.. - N. 3 T.

Geotrupes pyrenaeus Chárp. subsp.. - N. 1 T. - det. Focarile.

Geotrupes spiniger Marsh.. - N. 1 T. - det. Focarile.

Scarabaeus laticollis L.. - N. 1 T.

Longitarsus succineus Foudr.. - N. 3 T. - det. Ruffo.

Diptera (Det. F. Venturi).

Gen. sp. (Fam. *Sciaridae*; tribù *Lestremiini*). - Tre forme diverse prese nel N. 1 T.

Gen. (*Phalacrotophora*?) sp. (Fam. *Phoridae*; tribù *Gymnophorini*). - N. 3 T.

Helomyza serrata (L.). - N. 3 T.

Cypselia glacialis Meig.. - N. 3 T.

Sphaerocera subsultans (L.). - N. 3 T.

Nycteribia (Celeripes) biarticulata Hermann. - Su *Rhinolophus ferrum-equinum ferrum-equinum* (Schreb.), in tutte le grotte frequentate da questa specie.

AMPHIBIA

Caudata (Det. B. Lanza).

Hydromantes italicus Dunn. (= *H. genei italicus* Dunn, secondo Mertens in Wolterstorff). - N. 1, N. 2 e N. 3 T. (Cfr. B. Lanza; Arch. Zool. Ital., vol. XXXI).

Salamandrina ter-digitata (Lac.). - N. 3 T. - Specie nuova per la speleofauna.

Salientia (Det. B. Lanza).

Bufo bufo spinosus Daudin. - N. 1, N. 2, N. 3 e N. 4 T.

Rana graeca Boul.. - N. 1 e N. 3 T. - Specie nuova per la speleofauna.

REPTILIA

Serpentes (Det. B. Lanza).

Natrix natrix helvetica (Lacépède). - N. 3 T. Nuova per la speleofauna.

MAMMALIA

Rodentia (Det. L. Cardini).

Glis glis italicus Barr. Hamilton. - Resti ossei recenti nella N. 1 e N. 5 T.; nelle anfrattuosità del soffitto della N. 3 T. ho visto una volta rifugiarsi un mammifero quasi sicuramente appartenente a questa specie.

Eliomys quercinus (L.). - Resti ossei recenti nella N. 1 T.

Chiroptera (Det. B. Lanza),

Rhinolophus ferrum-equinum ferrum-equinum (Schreb.). - N. 1, N. 3, N. 4 e N. 5 T.

Rhinolophus hipposideros minimus Heugl.. - N. 1, N. 3, N. 4 e N. 5 T.

Barbastella barbastellus (Schreb.). - N. 3 T.

Plecotus auritus (L.): - N. 3 T.

Firenze, 19 Giugno 1946.